

Headline **Kepong Botanical Gardens**
Date **22 Jan 2011**
MediaTitle **Sin Chew Daily**
Section **Sin Chew Plus**
Journalist **N/A**
Frequency **Daily**
Circ / Read **383,775 / 1,091,000**

Language **Chinese**
Page No **L-16**
Article Size **556 cm²**
Color **Full Color**
ADValue **13,267**
PRValue **39,802**



16 快樂家庭 編輯：何承學
星洲日報 2011年1月22日 星期六

大馬路呼吸

本期主題：**郊野行腳**
綠色生活家：周敏儀

● 甲洞森林局研究員，從事自然研究、保育工作近十年，徜徉大自然之中，欣賞自然之美，尽自己所能，為自然做點事。

本期行腳：**甲洞植物公園**



黃花狸藻花的正面，左右對稱的花朵，分成上下萼片和唇瓣，下唇瓣微微內凹。（周敏儀拍攝）



黃花狸藻的花和羽狀復葉。



黃花狸藻的花序靠浮托器官挺出水面。在靜止的湖面上黃花點點，十分動人。

報道：本報 張佩莉 攝影：本報 卓衍豪／部分照片由周敏儀提供

黃花狸藻 從廢礦湖出走

周敏儀帶我們走進甲洞植物園，公園里，有好幾面湖，其中一面面積較小的，水面上開滿黃色小花，遠遠看去，靜止的湖面上黃花點點，煞是漂亮。

黃花狸藻乍看有點像金魚藻，羽狀裂葉通常一串串或一叢叢地浮在水面，花序靠浮托器官筆直地挺出水面。別看它嬌小可人，水面下可是藏着致命殺機哦！

把一株小黃花拉離水面，就會看到底下的羽狀復葉有許多大大小小的捕蟲囊。捕蟲囊口外，有一對仿如“奎籠”的長毛圍筒，能把水中游動的蟲子導向囊口。捕蟲囊口上，有極為敏感的腺毛，一旦蟲子接近囊口，腺毛會即刻傳達訊息到囊口膜，打開

半真空狀態的囊口，以千分之一秒的速度吸食小蟲！囊內壁則能分泌消化液，分解

和吸收養分。最後，囊內腺毛排出多余的水分，數小時後，捕蟲囊再回復真空狀態，等待下一只不幸的獵物！

黃花狸藻曾是本地廢礦湖里最常見的野花，但在幾年前，周敏儀開車從霹靂打巴到金寶，經過大大小小的廢礦湖，卻連一朵小黃花也找不到。黃花狸藻無聲無息地消失，讓周敏儀失落又擔憂。

她和朋友幾乎踩遍霹靂中南部的廢礦湖，最後才在一个人烟罕至的礦湖里找到黃花狸藻。她也發現：“黃花狸藻生長的地方，水質呈酸性、沒有氧化銹迹象，周圍的植物多是本地的原生種。”

“黃花狸藻是我國天然原生種先驅植物，也是半島最常見的狸藻，只是隨着社會發展，數十年前‘黃花狸藻到處生長在廢礦湖中’的文獻，現在要改寫了！”她溫和的笑容里藏着無限感慨。



① 黃花狸藻（周敏儀拍攝）② 捕蟲囊近看：透明的是剛長出來、還沒有開始捕蟲的新囊，黑紫色的是已經“吃”飽飽、肚子裡全是蟲骸的捕蟲囊。（周敏儀拍攝）